

MÈTODES ANTICONCEPTIUS

GAUDEIX DE LA SEXUALITAT
AMB TRANQUIL·LITAT



Conselleria de Salut
Direcció General de Salut Pública



MÈTODES DE BARRERA QUÍMICS (Espermicides i òvuls vaginais)

Alteren la mobilitat dels espermatozoides o els maten. S'han d'utilitzar combinats amb el preservatiu o amb el diafragma.
TOTS SÓLS NO OFEREIXEN UNA PROTECCIÓ SUFICIENT.

MÈTODES DE BARRERA

Impedeixen que els espermatozoides passin a la cavitat uterina.
EFICÀCIA ALTA.



PRESERVATIU EXTERN

Funda impermeable de làtex, poliuretà o poliestirè, que es colloca en el penis quan està en erecció.



PRESERVATIU INTERN

Bossa petita de poliuretà, lubricada i tancada per un costat, amb una anella flexible i adaptable a cada extrem.



DIAFRAGMA

Caputxa de làtex o silicona que s'encaixa dins el coll de l'úter.

MÈTODES ANTICONCEPTIUS HORMONALS

Impedeixen l'ovulació mitjançant l'administració d'una hormona (progestagen) o de diverses (progesterona i estrogen).

EFICÀCIA MOLT ALTA.



PASTILLA

Comprimit que conté una hormona (minipastilla) o dues hormones (pastilla combinada).



INJECTABLES

Suspensions (líquids) que contenen una o dues hormones.



ANELL VAGINAL

Anell de plàstic flexible que s'introduceix dins la vagina i allibera hormones.



MÈTODES PERMANENTS

Impedeixen que l'òul passi a l'úter (esterilització tubàrica i lligadura de trompes) o que els espermatozoides surtin a l'exterior (vasectomia). **EFICÀCIA MOLT ALTA.**



ESTERILITZACIÓ TUBÀRICA

Dispositiu flexible que s'introdueix en les trompes de Falopi per via vaginal, per obstruir-les.



DISPOSITIUS INTRAUTERINS

Dificulen l'ascens dels espermatozoides i impedeixen la nidació de l'òul provocant una inflamació dins l'úter. **EFICÀCIA MOLT ALTA.**



DIU I DIU HORMONAL

Objecte flexible que du enrotllat un filament de coure o de poliuretà. Pot incorporar un reservori hormonal que allibera progesterona per inhibir l'ovulació.



NO SÓN MÈTODES ANTICONCEPTIUS

Dificulen l'ascens dels espermatozoides i impedeixen la nidació de l'òul provocant una inflamació dins l'úter. **EFICÀCIA MOLT ALTA.**



LACTÀNCIA

Coit interromput "marxa enrere".



COIT DURANT LA MENSTRUACIÓ



ABANS D'UTILITZAR UN MÈTODE ANTICONCEPTIU

Informa't
Acudeix al teu centre de salut



Assegura't que en coneixes:

- l'eficàcia
- les contraindicacions i els efectes adversos
- com utilitzar-lo correctament
- la forma de conservació i la data de caducitat



ANTICONCEPCIÓ D'URGÈNCIA

Consisteixen a evitar el coit vaginal durant els dies en què és més probable l'ovulació. **L'EFICÀCIA ÉS MOLT BAIXA** atès que en qualsevol moment es pot produir una ovulació i és possible l'embaràs.



PASTILLA POSTCOITAL O DE L'ENDEMÀ

Tractament hormonal que bloqueja o retarda l'ovulació.



MÈTODES NATURALS

OGINO-KNAUS (*mètode del calendari*)
Càlcul del dia probable d'ovulació segons les etapes del cicle menstrual.



S'HA D'UTILITZAR NOMÉS DE MANERA excepcional.



BILLINGS (*mètode del moc cervical*)

S'observa diàriament el moc vaginal (és més fluid durant l'ovulació).



VASECTOMIA

Bloqueig dels conductes deferents mitjançant una intervenció quirúrgica.



TEMPERATURA BASAL

Es pren diàriament la temperatura i s'observa quan puja (la temperatura augmenta lleugerament després d'ovular entre 0,2 i 0,4 graus).



EVITAR UN EMBARÀS

és qüestió de dos, és una responsabilitat que s'ha de compartir



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

DISFRUTA DE LA SEXUALIDAD CON TRANQUILIDAD



Conselleria de Salut
Direcció General de Salut Pública



MÉTODOS BARRERA QUÍMICOS (Espermicidas y óvulos vaginales)

Alteran la movilidad de los espermatozoides o los matan. Tienen que utilizarse combinados con el preservativo o con el diafragma.
SOLOS NO OFRECEN UNA SUFICIENTE PROTECCIÓN.

MÉTODOS BARRERA

Impiden que los espermatozoides pasen a la cavidad uterina.
EFICACIA ALTA.

PRESERVATIVO EXTERNO

Funda impermeable de látex, poliuretano o poliestireno, que se coloca en el pene cuando está en erección.



PRESERVATIVO INTERNO

Bolsa pequeña de poliuretano, lubrificada y cerrada por un lado, con una anilla flexible y adaptable a cada extremo.

DIAFRAGMA

Capucha de goma (látex o silicona) que se encaja dentro del cuello del útero.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Impiden la ovulación mediante la administración de una hormona (progesterona) o diversas hormonas (progesterona y estrógeno).
EFICACIA MUY ALTA.

PASTILLA

Comprimido que contiene una hormona (minipastilla) o dos hormonas (pastilla combinada).

INJECTABLES

Suspensiones (líquidos) que contienen una o dos hormonas.

ANILLO VAGINAL

Anillo de plástico flexible que se introduce dentro de la vagina y libera hormonas.

IMPLANTE SUBCUTÁNEO

Pequeña varilla de plástico que se coloca debajo de la piel y libera una hormona.

PARCHÉ ANTICONCEPTIVO

Tira adhesiva que se pega a la piel y libera lentamente dos hormonas.

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

ESTERILIZACIÓN TUBÁRICA

Dispositivo flexible que se introduce en las trompas de Falopio por vía vaginal, para obstruirlas.

DIU I DIU HORMONAL

Objeto flexible que lleva enrollado un filamento de cobre o poliuretano. Puede incorporar un reservorio hormonal que libera progesterona para inhibir la ovulación.

LIGADURA DE TROMPAS

Bloqueo de las trompas de Falopio mediante intervención quirúrgica.

OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

BILLINGS (método del moco cervical)

Se observa diariamente el moco vaginal (es más fluido durante la ovulación).

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

LA EFICACIA SE REDUCE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

MÉTODOS PERMANENTES

Impiden que el óvulo pase al útero (esterilización tubárica y ligadura de trompas) o que los espermatozoides salgan al exterior (vasectomía). **EFICACIA MUY ALTA.**

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

Dificultan el ascenso de los espermatozoides e impiden la nidación del óvulo provocando una inflamación dentro del útero. **EFICACIA MUY ALTA.**

NO SON MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Dificultan el ascenso de los espermatozoides e impiden la nidación del óvulo provocando una inflamación dentro del útero. **EFICACIA MUY ALTA.**

COITO INTERRUMPIDO "MARCHA ATRÁS"

Dificultan el ascenso de los espermatozoides e impiden la nidación del óvulo provocando una inflamación dentro del útero. **EFICACIA MUY ALTA.**

LACTANCIA

Dificultan el ascenso de los espermatozoides e impiden la nidación del óvulo provocando una inflamación dentro del útero. **EFICACIA MUY ALTA.**

COITO DURANTE LA MENSTRUACIÓN

Dificultan el ascenso de los espermatozoides e impiden la nidación del óvulo provocando una inflamación dentro del útero. **EFICACIA MUY ALTA.**

DUCHA VAGINAL

Dificultan el ascenso de los espermatozoides e impiden la nidación del óvulo provocando una inflamación dentro del útero. **EFICACIA MUY ALTA.**

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA

Consisten en evitar el coito vaginal durante los días en los que es más probable la ovulación. **LA EFICACIA ES MUY BAJA** dado que en cualquier momento puede producirse una ovulación y es posible el embarazo.

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquea o retrasa la ovulación.

OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

LA EFICACIA SE REDUCE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

BILLINGS (método del moco cervical)

Se observa diariamente el moco vaginal (es más fluido durante la ovulación).

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

MÉTODOS NATURALES

Consisten en evitar el coito vaginal durante los días en los que es más probable la ovulación. **LA EFICACIA ES MUY BAJA** dado que en cualquier momento puede producirse una ovulación y es posible el embarazo.

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquea o retrasa la ovulación.

OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

LA EFICACIA SE REDUCE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

BILLINGS (método del moco cervical)

Se observa diariamente el moco vaginal (es más fluido durante la ovulación).

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

MÉTODOS NATURALES

Consisten en evitar el coito vaginal durante los días en los que es más probable la ovulación. **LA EFICACIA ES MUY BAJA** dado que en cualquier momento puede producirse una ovulación y es posible el embarazo.

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquea o retrasa la ovulación.

OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

LA EFICACIA SE REDUCE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

BILLINGS (método del moco cervical)

Se observa diariamente el moco vaginal (es más fluido durante la ovulación).

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

MÉTODOS NATURALES

Consisten en evitar el coito vaginal durante los días en los que es más probable la ovulación. **LA EFICACIA ES MUY BAJA** dado que en cualquier momento puede producirse una ovulación y es posible el embarazo.

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquea o retrasa la ovulación.

OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

LA EFICACIA SE REDUCE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

BILLINGS (método del moco cervical)

Se observa diariamente el moco vaginal (es más fluido durante la ovulación).

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

MÉTODOS NATURALES

Consisten en evitar el coito vaginal durante los días en los que es más probable la ovulación. **LA EFICACIA ES MUY BAJA** dado que en cualquier momento puede producirse una ovulación y es posible el embarazo.

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquea o retrasa la ovulación.

OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

LA EFICACIA SE REDUCE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

BILLINGS (método del moco cervical)

Se observa diariamente el moco vaginal (es más fluido durante la ovulación).

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

MÉTODOS NATURALES

Consisten en evitar el coito vaginal durante los días en los que es más probable la ovulación. **LA EFICACIA ES MUY BAJA** dado que en cualquier momento puede producirse una ovulación y es posible el embarazo.

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquea o retrasa la ovulación.

OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

LA EFICACIA SE REDUCE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

BILLINGS (método del moco cervical)

Se observa diariamente el moco vaginal (es más fluido durante la ovulación).

VASECTOMÍA

Bloqueo de los conductos deferentes mediante una intervención quirúrgica.

TEMPERATURA BASAL

Se toma diariamente la temperatura y se observa cuándo sube (la temperatura aumenta ligeramente después de ovular: entre 0,2 y 0,4 grados).

MÉTODOS NATURALES

Consisten en evitar el coito vaginal durante los días en los que es más probable la ovulación. **LA EFICACIA ES MUY BAJA** dado que en cualquier momento puede producirse una ovulación y es posible el embarazo.

PASTILLA POSTCOITAL O DEL DÍA DESPUÉS

Tratamiento hormonal que bloquea o retrasa la ovulación.

OGINO-KNAUS (método del calendario)

Cálculo del día probable de ovulación según las etapas del ciclo menstrual.

TIENE QUE UTILIZARSE SÓLO DE FORMA excepcional.

Tiene que tomarse cuanto antes mejor, después de la relación sexual (coito sin protección o fallo del método anticonceptivo).

LA EFICACIA SE REDUCE A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

Se dispensa en los centros de salud y farmacias sin receta médica.

BILLINGS (método del moco cervical)

Se observa diariamente el moco vaginal (es más fluido durante la ovulación).